



Circé

Vass7R01s306-310



Collection Vassal-Montpellier

836Mtp2

Fig 1 s 306-310
Circé


836


836Mtp2

Circé

Vass7R01s306-310

22/07 x6







ANNEE: 1994

NOM *Piné*

EMPLACEMENT 7 R1 306-310

083602

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8											
2												
3	2	14.3	17.3*	0								
4	2	7.3	10.3*	0								
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

DE 10.3.94 (+3)

ANNEE: 1995

NOM *Piné*

EMPLACEMENT 7 R1 306-310

083602

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2				2	27.5	30.5	3.6	10.7	11.7	11.7	1.8
2							+2			-1		-2
3	2	16.3	20.3*	0								
4	2	20.3	23.3*	1								
5	4											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : 0 Mill : 1
Baie : TG - G - M - P Dim : 13x15
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : 0.5

DE 20.3.95 (+3)

14024

cinée

$$(27.79) 0836.02$$

AMPLACEMENT

7 R1 A 306.310

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4											
3	2	18.3	22.3 *	0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Bill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-all-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - al - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	2	18.3	22.3 *	0								
5	1	le 22.3 96 (+6)										

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Circé
7 R 1 s. 306-310-4

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 93

Formulaire description 4 / 8 (nouaison-véraison)		Emplacement <i>FR 1 s 306-310</i>
Nom variété / introduction <i>Cince</i>		Remarques <i>forte attaque mildiou</i>
Observateur - Date <i>CM - 31/7/2018</i>	Code var / intro <i>836 Mtp 2</i>	

LIMBE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
065 = 17	Taille du limbe	très petite	<u>petite</u>	moyenne	grande	très grande
067 = 18	Forme du limbe	1-cordiforme	2-cunéiforme	3-pentagon.	<u>4-orbicul.</u>	5-rénif.
068 = 20	Nombre de lobes	1-F. entière	2-trois	<u>3-cinq</u>	4-sept	5- + de sept
069	Couleur face supérieure limbe		vert clair	<u>vert moyen</u>	vert foncé	
070 = 27	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face supérieure du limbe	<u>1- nulle</u>	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- - jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- - au-delà de la 2 ^{ème} bifurc
071	Distribution de la pigmentation anthocyanique des nervures principales, face inférieure du limbe	<u>1- nulle</u>	2- seulement au point pétiole	3- jusqu'à 1 ^{ère} bifurc.	4- - jusqu'à 2 ^{ème} bifurc.	5- - au-delà de la 2 ^{ème} bifurc
074	Profil du limbe	<u>1-plan</u>	2-en V	3-involuté	4-révoluté	5-tourmenté
073	Ondulation du limbe (entre nervures I ou II)	<u>absente</u>				présente
072	Gaufrage du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>absente ou t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
075 = 19	Cloque de la face sup. du limbe (entre nerv. dernier ordre)	nulle à t. fb.	faible	<u>moyenne</u>	forte	très forte
084 = 28	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	nulle à t. fb.	<u>faible</u>	moyenne	forte	très forte
085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
087 = 29	Densité p. dressés des nerv. face inf.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
088	Villosité couchée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>absente</u>				présente
000-44	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
000-45	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte

PETIOLE						
090	Densité poils couchés sur le pétiole	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
091	Densité poils dressés sur le pétiole	<u>nulle à t. fb.</u>	faible	moyenne	forte	très forte
093 = 30	Longueur pétiole p/r nervure médiane	plus court	<u>légér. plus court</u>	égal	légér. plus long	plus long
000-06	Couleur du pétiole	1 - coloré	<u>2 - partiel. coloré</u>	3 - vert		

SINUS PETIOLAIRE (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
079 = (23)	Degré d'ouverture/chevauchement du sinus pétiole	très ouvert	<u>ouvert</u>	fermé	chevauchant	très chev.
	+ocvv	<u>très larg. ouvert</u>	<u>demi-ouvert</u>	<u>peu ouvert</u>	<u>légér. chev.</u>	<u>très fort. chev</u>
080	Forme de la base du sinus pétiole	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
081-1	Dent dans la sinus pétiole	<u>absents</u>				présents
081-2	Base du sinus pétiole limité par la nervure	<u>1- non limité</u>	2- sur un côté	3- sur les deux côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
082 = (22)	Degré d'ouverture/chevauchement des sinus latéraux supérieurs	<u>1- ouverts</u>	2- fermés	3- légèrement chevauchants	4- très chevauchants	5- absence de sinus
094 = 21	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	absence ou très peu profond	peu profond	<u>moyens</u>	profonds	très profonds
083-1	Forme de la base des sinus latéraux supérieurs	1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
083-2	Dent dans les sinus latéraux supérieurs	<u>absentes</u>				présents

DENTS (EGALEMENT OBSERVABLE SUR FEUILLES D'HERBIER, FORMULAIRE N° 7)						
076 = 26	Forme des dents	1- à deux côtés concaves	<u>2- à deux côtés rectilignes</u>	3- à deux côtés convexes	4- un c. concaves, un c. convexes	5- mélange notation 2 et notation 3
077 = ((24))	Taille des dents par rapport à la taille du limbe	très petites	petites	moyennes	<u>grandes</u>	très grandes
078 = 25	Longueur des dents par rapport à leur largeur	très courtes	courtes	<u>moyennes</u>	longues	très longues

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE <i>NON OBS</i>						
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	très faible (<10%)	faible (11-30%)	moyen (31-50%)	élevé (51-70%)	très élevé (>80%)
303 = 31	Époque de début de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive

INRA Vassal	Virus ENR	Mildiou <i>F-5, I=7</i>	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)	Virus CN	Oïdium	Eutypiose	Carence Mg
Codes 000-internes	Autre	Botrytis	Exciosiose	Autre



Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 2000

Observateur :

Code cépage : 0836

Code clone : 02

Nom cépage : Cécé

Emplacement : 7R1 2306-320

TF 2000

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.